

Szüret 2020



BASF
We create chemistry



Az országos lefedettségű szőlővédelmi állomáshálózatunk adatai alapján, pontosan nyomon követhetjük az érés előrehaladtát egyes borvidékeinken a számított hőösszegekkel. Ez természetesen nem helyettesíti a próbaszüretek alkalmával mért cukor- és savtartalmak pontos adatait, de iránymutatást ad az egyes éréscsoportokhoz tartozó fajták szüreti idejének megbecsüléséhez.

I_h =Huglin-féle heliotermikus index


Az április 1. és szeptember 30. között felhalmozódott, a szőlőnövény számára hasznos hőmennyiség °C-ban.

$$HI = K \cdot \sum_{01.04.}^{30.09.} \left(\frac{T_{\text{mean}} + T_{\text{max}}}{2} - 10 \right)$$

Szőlőfajta	A szőlőfajta beéréséhez szükséges hőmennyiség (I_h , °C)
	1300
Csaba gyöngye, Irsai Olivér	1400
Rizlingszilváni, Kékoportó	1500
Pinot blanc, Szürkebarát, Tramini	1600
Pinot noir, Rajnai rizling	1700
Cabernet franc, Kékfrankos, Merlot	1800
Cabernet sauvignon, Olasz rizling	1900
Ugni blanc	2000
Grenache, Syrah	2100
Carignan	2200

Szőlővédelmi állomáshálózatunk

BASF
We create chemistry



Borvidék	BASF Defenso állomás	Hőmennyiség [I _n , °C] szeptember 21-ig	Csapadék [mm] 08.31 - 09.21.	Napi min. [°C] 08.31.-09.21.
Soproni	Kőszeg	2071	42.1	7,3
	Balf-Hard-dűlő	2153	42.8	5,7
Pannonhalmi	Pannonhalma-Széldomb	2196	27.6	6,4
	Győrszemere-Szőlőhegy	2234	35	7,4
	Győrújbarát	2209	18.6	6,7
Neszmélyi	Tata-Felső Látó	2086	21.2	6,8
	Neszmély-Melegeshegy	2104	24.2	9,8
	Kesztölc	2374	31	8,1
Móri	Mór-Pohárhegy	2162	22.2	3,9
	Csókakő-Űrgehegy	2190	21.4	9,1
Etyek-Budai	Etyek	2256	26	5,4
	Pázmánd	2276	16	4,9
	Tök	2009	22.5	6,5
Nagy Somlói	Somlószőlős	2152	30.6	4,5
	Somló (Nyugat)	2159	33.6	5,09
Zalai	Zalasabar	2178		9,5
Balaton-felvidéki	Lesencetomaj	2192	9	6,04
Balatonfüred-Csopak	Balatonfőkajár	2239	21.6	2,7
	Paloznak	2219		9,8
	Pécsely	2138	15.2	4,2
	Balatoncsicsó	2134	0.4	9,1
Balatonboglári	Szólád	2283	18.2	8,1
	Ordacsehi	2209	19.8	7,9
Tolnai	Möcsény	2234	8.6	2,2
Szekszárdi	Szekszárd-Palánk	2247	10.6	7,4
	Szekszárd-Faluhely	2354	12.4	7,4
	Báta-Látó-hegy	2428	10.2	7,4
	Szentgál-szőlőhegy	2322	8.4	7,5
	Várdomb-Szeleshát	2301	0.4	6,6
Pécsi	Pécs-Murom-dűlő	2176	10.6	10,2
	Mecseknádasd	2200	10.4	6,6
Villányi	Villány-országút alatti dűlő	2392	7.4	16,8
	Villány-Ördögárok	2237	10.6	8,5
	Diósvizsló	2302	15.4	7,5
Hajós-Bajai	Borota	2325	9.8	3,7
Csongrádi	Ásotthalom	2317	5	0,62
Kunsági	Soltvadkert	2374	11.8	1,7
	Kiskunhalas	2333	2.4	1,1
	Gomba	2199	32	5,4
	Izsák	2233	15.4	3,6
	Kecel	2299	6.2	0,8
	Lakitelek	2292	6.2	2,6
Mátrai	Gyöngyöstarján	2189	0.4	9,4
	Visonta	2163	2.6	10,1
	Szűcsi-Katona berek			
Egri	Eger	2052	17.4	7,6
	Eger Szakiskola	2096	6.8	5,7
	Verpelét - Kiskút-tábla	2192	14	7,2
	Feldebrő-Csepegő	2189	33.8	7,8
	Noszvaj	2138	27.8	9,1
Bükki	Emőd	2263	7.6	7,8
Tokaji	Mád Holdvölgy	2014	6.2	8,4
	Sárospatak-Királyhegy	2146	0.2	8,08

Csapadék: szeptember elseje óta nem volt számottevő csapadék. A szüret szempontjából ez nagyon kedvező. A szeptember első napján hullott csapadék óta azonban, szinte minden hajnalban jelentős a harmatképződés. Szüret: Az aszúsodás elkezdődött. Nagyon jó minőségben kerül le aszú a tőkékről, igaz egyelőre nem olyan nagy mennyiségben, mint tavaly. Ecetesezés nem indult el. Tokajban a pezsgőalapokat (Furmint) már leszedték. Jelenleg a száraz/félszáraz tételek szürete veszi kezdetét. A savtartalom helyenként még elég magas (11 g/liter). Egerben a rozé alapok szürete már a végéhez közeledik. Jelenleg a Pinot Noir-nál tartanak. A vörösbarnak szánt Kékfrankos még a legtöbb helyen a tőkén van. A Mátrában a Tramini, a Rizlinszilváni és Szürkebarát szürete a legtöbb gazdaságban lassan befejeződik. A Kékfrankos szürete most kezdődött. Növényvédelem: az elmúlt két hét száraz időjárásának köszönhetően a botritisz nem okozott problémát. A lisztharmat a levélen egyre több helyen megjelenik. Igaz a legutolsó növényvédelmi beavatkozások 3-4 hete történtek. A lisztharmathoz képest sokkal látványosabb a peronoszpóra jelenléte. A hónaljajtásokon és a vitorlán jelen van.




**Tokaji bv.,
Bükk bv.,
Egri bv.,
Mátrai bv.**

**Növényvédelmi javaslat
szüret után:**

Lisztharmat ellen:
Peronoszpóra ellen:

Kumulusz 4 kg/ha (é.v.i.- nap)
réz hatóanyag

A múlt héten beígért csapadék és lehűlés egyelőre nem érkezett meg. A reggelek sokfelé párásak és hűvösek, napközben közel 30 fok van. A mustfokok a csapadékhiány miatt elmaradnak a várttól és az ország többi részéhez hasonlóan az Alföldön sincs súlya a fürtöknek. A fürtmennyiség alapján elvárható súlynak kb. 75-80 %-a kerül általában betakarításra. A rosé szüreten túlvagyunk. Néhány helyen már elkezdtek a vörösborszőlők szüretét. A rizlingek és a Kövidinka szürete még várat magára. A bogyók egészségesek, rothadás nincs, de a hétvégére előrejelzett csapadék, ha valóban megérkezik, még beindíthatja a botritist.



**Kunsági bv.,
Hajós-Bajai bv.,**

**Növényvédelmi javaslat
szüret után:**

Lisztharmat ellen:
Peronoszpóra ellen:

Kumulusz 4 kg/ha (é.v.i.- nap)
réz hatóanyag



Vizer Bence



BASF
We create chemistry



Az É-Dunántúlon a szüret felén már túl vagyunk. Jelenleg a középérésű fajták betakarítása zajlik. Annak ellenére, hogy a fűrtszámok ígéretes terméskilátásokkal bíztattak, mégis a termésátlagok a tavalyi évhez képest 20-25%-kal kevesebbnek bizonyulnak. Az elmúlt 2-3 hét száraz, meleg időjárásának köszönhetően a szürkepenész fertőzés nem eszkalálódott tovább. Az augusztus végi erősen csapadékos időszak nyomán rothadásnak indult bogyók, fűtrészek szépen beszáradtak. A levélzet peronoszpóra, valamint lisztharmat borítottsága fokozódik, érzékeny fajták esetében már a nekrotizálódott levelek hullása is megkezdődött. A vesszők jövő évi zavartalan beéréséhez mérlegeljük a szüreti utáni kontakt szerekkel (réz, kén) történő zárókezelések megkezdését.



**Soproni,
Pannonhalmi,
Neszmélyi,
Móri,
Etyek-Budai,
Nagy-Somlói, Zalai,
Balatonfelvidéki
Balatonfüred-
Csopaki,
Balatonboglári
borvidékek**

**Növényvédelmi javaslat
szüret után:**

Lisztharmat ellen:
Peronoszpóra ellen:

Kumulusz 4 kg/ha (é.v.i.- nap)
réz hatóanyag



Maros Péter



Dr. Hoffmann Péter



BASF
We create chemistry



A felénél tart a szüret, de most kezd nagyon felgyorsulni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a muslica fajok gradálnak és több vörösborszőlő fajtát is kényszerűségből kezdtek el szüretelni. A botritisz mindenhol megállt, csapadék felénk sincs, augusztus utolsó dekádjában esett és a hajnali pára is töredéke a múltéknak. Az Oportó, Kadarka és rothadásra hajlamos fajták szürete gőzerővel zajlik a hétvégi csapadék előtt. A Kékfrankost szép mustfokkal szüretelik (21-22°MM). A minőség az időben szüretelt tételknél jónak mutatkozik, a mennyiség elmarad az elmúlt évhez képest.



**Tolnai bv.,
Szekszárdi bv.,
Pécsi bv.,
Villányi bv.**

**Növényvédelmi javaslat
szüret után:**

Lisztharmat ellen:
Peronoszpóra ellen:

Kumulusz 4 kg/ha (é.v.i.- nap)
réz hatóanyag



Aszúretre váró Hárslevelű Tokaj-Hegyalja, Pajzos-dűlő



Leszúrtelt aszúbogyók
feldolgozás előtt
Tokaj-Hegyalja, Pajzos-dűlő



Cabernet sauvignon fürtjei
Egerszőlát



Aszúsodó Hárslevelű bogyók
Tokaj-Hegyalja, Pajzos-dűlő