



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Előadó: Kővári Melinda**  
**Határozatszám: 04.2/1728-1/2014.**  
**Oldalak száma: 2 oldal**  
**Melléklet: -**

**Tárgy: Stomp Super gyomirtó  
permetezőszer** forgalomba hozatali  
és felhasználási engedélyének  
módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **BASF Hungária Kft.** (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt **BASF S.E.** (D-67056 Ludwigshafen, Németország) ügyfél részére a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az engedélyező hatóság a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *02.5/1120/1/2009. MgSzHK* számú határozatot az alábbiak szerint:

#### **m ó d o s í t j a:**

*Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**11. Eltarthatósági idő:** fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. március 10.

**Dr. Oravecz Márton**  
**elnök**  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél hazai képviselője.
2. Irattár.

(88/2014.)



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Előadó: Kővári Melinda**  
**Határozatszám: 04.2/7295-1/2013.**  
**Oldalak száma: 2 oldal**  
**Melléklet: -**

**Tárgy: Stomp Super gyomirtó  
permetezőszer** forgalomba hozatali  
és felhasználási engedélyének  
módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft.** (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt **BASF S.E.** (D-67056 Ludwingshafen, Németország) ügyfélnek a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az engedélyező hatóság a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *02.5/1120/1/2009. MgSzHK* számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

#### **m ó d o s í t j a:**

*I. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**11. Eltarthatósági idő:** *fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi*

*II. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

**12. Érvényességi idő: 2018. december 31.**

*III. Az engedélyokirat az alábbi 13. ponttal egészül ki:*

#### **13. Kiszерelés, csomagolás:**

13.1. A kiszерelés térfogata/tömege: 0,25 l; 1 l; 5 l; 10 l

13.2. A csomagolószer anyaga: HDPE

Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2013. december 5.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(411/2013.)



## Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság  
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Lázár Nelli**  
**HATÁROZATSZÁM: 02.5/11063-2/2010.**  
**OLDALAK SZÁMA: 7**  
**MELLÉKLET:-**

**TÁRGY: Stomp Super gyomirtó  
permetezőszer forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyének módosítása**

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **BASF Hungária Kft.** (1132 Budapest, Váci út 30.) által képviselt **BASF S.E.** (D-67056 Ludwingshafen, Németország) ügyfél kérelmére a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t .**

Az engedélyező hatóság a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/1120/1/2009. MGSZHK számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

#### **m ó d o s í t j a:**

#### **I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

#### **6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyisége</b>	
őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, triticale	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	200-300
rizs	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	200-300
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	3,3-6,0	200-300
napraforgó, dohány, burgonya, borsó, lóbab, szója	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-6,0	200-300
dohány	kacsgátlás	1,5 %	400-500
lucerna	aranka	8,0-10,0	500-600
vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	3,0-4,0	200-300
sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika, káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	200-300
Almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya), Csonthéjasok (kajszi, őszibarack, cseresznye,	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	300-400

meggy, szilva, ringló)			
Bogyós gyümölcsűek (ribiszke, köszméte, josta, málna, áfonya, szeder, szamóca), Szőlő (bor és csemege)	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	300-400
fűszer- és gyógynövények, dísnövények, erdészet (faiskola, kosárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, fenyőfélék, juniperus)	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	200-300
vörös csenkesz	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	4,0-5,0	200-300

<b>Kultúra</b>	<b>Kezelések minimális és maximális száma</b>	<b>maximális összes dózis (l/ha)</b>	<b>az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)</b>
őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, triticale	1	5,0	bokrosodás kezdete
rizs	1	5,0	1-2 leveles állapot
kukorica (takarmány, vetőmag, csemege)	1	6,0	4 leveles állapot
napraforgó	1	6,0	preemergens
dohány	1	6,0	palántázás előtt
dohány (kacsgátlás)	1	1,5 %	virágzás kezdete
burgonya	1	6,0	preemergens
borsó	1	6,0	preemergens
lóbab	1	6,0	preemergens
szója	1	6,0	preemergens
lucerna	1	10,0	tavasszal a lucerna nyugalmi állapota
vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma	1	4,0	preemergens
sárgarépa, petrezselyem	1	5,0	preemergens
zeller	1	5,0	palántázás előtt
paradicsom, paprika	1	5,0	palántázás előtt
káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé	1	5,0	palántázás előtt
almatermésűek, csonthéjasok	1	5,0	preemergens
szőlő	1	5,0	preemergens
bogyósok	1	5,0	preemergens
fűszernövények, gyógynövények	1	5,0	preemergens
dísnövények	1	5,0	preemergens
erdészet	1	5,0	preemergens

vörös csenkesz	1	5,0	preemergens
kosárfűz	1	5,0	preemergens

### **Előírt növényvédelmi technológia:**

**Kalászosokban** (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, triticale) vetés után kelés előtt preemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig posztemergensen kell a készítményt kijuttatni.

**Rizsben** a kultúrnövény kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen a vetést követő 3 napon belül kell kijuttatni. A preemergens alkalmazás esetén fontos, hogy a rizs vetése egyenletesen 2-3 cm mélységre történjen. A kezelést vízmentes területen kell elvégezni, a táblán pangó vízfoltok sem lehetnek, mert a levegő hiánya és a herbicid együttesen a rizs csírázását gátolhatják.

**Kukoricában** (takarmány, vetőmag, csemege) a kultúrnövény vetése után, kelése előtt preemergensen, vagy korai posztemergensen lehet a készítményt felhasználni. Preemergens kijuttatás esetén a kukorica legalább 3-4 cm mélyre történő vetése után, 4,0-6,0 l/ha dózisban kell alkalmazni. A kukorica kelése után annak szögcsíra- 4 leveles fejlettségéig, a magról kelő egy- és kétszikűek szikleveles állapotában önmagában 5,0 l/ha dózisban kell felhasználni.

Amennyiben Clio 0,15 l/ha dóziséval tankkombinációban alkalmazzuk, úgy a Stomp Super dózisa 3,3 l/ha, ebben az esetben a kukorica fejlettségétől függetlenül a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles, a magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni.

A készítmény csemegekukoricában, vetőmag előállításban történő alkalmazása a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

**Napraforgóban** preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy ppi. 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

**Dohányban** palántázás előtt (pree. planting) a talajra permetezve, vagy 2-3 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni. Kacsgátlásra a kezelést a tengelyvirág megjelenésekor, legkésőbb a virágzás kezdetén, tetejezést követően, a kacsok 1-3 cm-es fejlettsége mellett kell elvégezni. Dohánytövenként 10-20 ml 1,5 %-os permetlé koncentrációjú szer mennyiség szükséges. Fontos a dohány szár egyenletes permetlével való fedése, a tövétől a tetejéig.

**Burgonyában** preemergensen a végleges bakháta kialakítása után kell a készítményt kipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak.

**Borsóban, lóbabban** preemergensen, a vetést követő 4-5 napon belül kell a kezelést elvégezni.

**Szójában** preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt ppi. sekélyen, 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

**Lucernában** arankairtásra egy évesnél idősebb állományban kora tavasszal, a lucerna nyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt.

**Hagymában** preemergensen, a dug- és magtermő anyag hagyma kiültetése után azonnal, magvetés esetén a vetést követő 3 napon belül kell a készítményt kipermetezni. Fontos az egyenletes, 3 cm mély vetésmélység. **Étkezésre termesztett zöldhagyma gyomirtására nem használható.**

**Sárgarépa, petrezselyem** esetében preemergensen, vetés után kelés előtt, a vetést követő 4-5 napon belül, **zeller** esetében a palántázás előtt 8-10 nappal kell kijuttatni a készítményt.

**Paradicsom, paprika** (pree planting) a palánták kiültetése előtt 8-10 nappal kell a készítményt kipermetezni.

**Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé** (pree planting) a kultúrnövények palántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. A palántázás során ügyelni kell arra, hogy a készítménnyel kezelt legfelső talajréteget ne sodorjuk a palánta gyökeréhez. Száraz időjárás esetén a sekély 1-2 cm mély talajba dolgozás a hatékonyságot növeli.

**Almatermésűek** (alma, körte, birs, naspolya), **csonthéjasok** (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló) esetében kora tavasszal, jól elmunkált, gyommentes, aprómorzsás talajfelszínre kell kipermetezni a készítményt, száraz időjárás esetén a sekély 1-2 cm mély talajba dolgozás a hatékonyságot növeli.

**Bogyós gyümölcsűek** (ribiszke, köszméte, josta, málna, áfonya, szeder, szamóca) kultúrákban kora

tavasszal, gyom- és növényi maradványoktól mentes, jól elmunkált talajfelszínre kell kijuttatni a készítményt. Szamócában a kezelést kora tavasszal, a kultúrnövény nyugalmi állapotában kell elvégezni.

**Szőlőben** (bor és csemege) a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jól elmunkált, aprómorzás talajfelszínre kell kijuttatni.

**Fűszer- és gyógynövények** (kömény, édeskömény, kapor, ánizs, angelika, lestyán, koriander, ligetszépe, sáfrányos szeklice) kultúrákban preemergensen vetés után, kelés előtt kell kipermetezni a készítményt.

**Dísznövények** (tulipán, nárcisz) esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi időszakában kell elvégezni, fontos hogy a hagymákat 3-4 cm aprómorzás földréteg takarja.

**Erdészet** (faiskola, kosárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, fenyőfélék, juniperus) kultúrákban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a gyomnövények megjelenése előtt kell elvégezni.

**Vörös csenkeszben** a gyomnövények megjelenése előtt kell a kezelést elvégezni.

A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények, és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen hatékony. Az évelőket, valamint a fészkes virágzatúak, keresztesek, burgonyafélék, mályvafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.

**A készítmény üvegházban, valamint fólia alatti területeken nem alkalmazható!**

Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon az engedélykiratban meghatározott magasabb dózisokban kell alkalmazni.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

## II. Az engedélykirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

### 7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

**Veszélyjelek:**



ártalmas



környezeti veszély

a) **Mérgező** (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >500, <2000 mg/kg.

b) **Tűzveszélyességi besorolás:** **nem jelölésköteles**

c) **Vízi szervezetekre való veszélyesség:** **kifejezetten veszélyes**

d) **Méhekre való veszélyesség:**

toxicitás alapon: **nem jelölésköteles**

kockázatbecslés alapján: **nem jelölésköteles**

**R-mondatok:**

**R-22** Lenyelve ártalmas

**R-36/38** Szem és bőrizgató hatású

**R-43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

**R50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**R-65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

**S-mondatok:**

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet



- S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást  
**S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni  
**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni  
**S 62** Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

### Különleges SP-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  
**SP e 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 méter** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!  
**Sp o 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

### III. Az engedélyokirat 8. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

#### 8. Várakozási idők:

- a) *Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap*  
b) *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

kultúra	várakozási idő
őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, triticale, rizs, kukorica	90 nap
napraforgó, burgonya, lóbab, szója	90 nap
vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma	75 nap
sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika, káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé	60 nap
borsó	42 nap
almatermésűek, csonthéjasok, bogyós gyümölcsűek, szőlő, fűszer- és gyógynövények,	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges
dohány, lucerna, vörös csenkesz, erdészet, dísnövények, kosárfűz	élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírás nem szükséges

### IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

**10, Forgalmazási kategória: III.**

Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb **2011. február 28-ig**. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani.

A engedély módosítási eljárás díja 200.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Bíróságtól** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

**A Határozat Indokolás része nem nyilvános!**

Budapest, 2010. szeptember 8.

**mb. elnök**

**Dr. Bognár Lajos**

**nevében és megbízásából**

**Tóthné Lippai Edit**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője.
2. Irattár.  
(160/2010.)



## **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ**

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Csaba Eszter**  
**HATÁROZATSZÁM: 02.5/1120/1/2009**  
**OLDALAK SZÁMA: 7**  
**MELLÉKLET: címkeszöveg**

**TÁRGY: STOMP SUPER gyomirtó**  
**permetezőszer forgalomba hozatali**  
**és felhasználási engedélye**

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság a **BASF SE** (Németország) képviseletében eljáró **BASF Hungária Kft.** (Budapest) ügyfélnek a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **HATÁROZAT-ot:**

Az engedélyező hatóság a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételek mellett adja ki:

#### **1. A növényvédő szer tulajdonosi és gyártói adatai**

<i>engedély tulajdonosa</i>	<b>BASF S.E.</b> D-67056 Ludwingshafen (Németország)
<i>engedély tulajdonos hazai képviselője</i>	<b>BASF Hungária Kft.</b> 1132 Budapest, Váci út 30
<i>készítmény gyártója</i>	BASF S.E. (Németország)
<i>hatóanyag gyártója</i>	BASF S.E. (Németország)

**2. A növényvédő szer rendeltetése:** gyomirtó permetezőszer

#### **3. A növényvédő szer hatóanyag összetevői :**

<i>hatóanyag</i>	
<i>ISO név</i>	<b>pendimetalin</b>
<i>IUPAC név</i>	<i>N-(1-etilpropil)-2,6 dinitro-3,4 xilidin</i>
<i>CAS szám</i>	<b>40487-42-1</b>
<i>részaránya</i>	330 g/l

**4. A növényvédő szer formulációja:** Emulzióképző koncentrátum (EC)

#### **5. Előírt minőségi feltételek:**

## 5.1. hatóanyag tartalom

pendimetalin (HPLC)

31,6± 1,4 %(m/m)

**Fizikai-kémiai tulajdonságok**

## 5.2 emulzió stabilitás (MT 36,3)

0 h

0,5 h

24 h

24,5 h

kezdeti emulzióképzés: teljes

„krém vagy olaj” maximum <2 cm<sup>3</sup>

ismételt emulzióképzés: teljes

„krém vagy olaj” maximum <2 cm<sup>3</sup>< 60 cm<sup>3</sup> (1 perc után)

## 5.3 habzóképeség (MT 47,2)

**Tárolási stabilitás**

## 5.4 tárolási stabilitás 0°C-on (MT39,3)

fázis szétválás nincs

## 5.5 tárolási stabilitás 54°C-on (MT 46,3)

a mért átlag hatóanyag tartalom nem lehet kevesebb, mint a kezdeti hatóanyag tartalom relatív 95%-a és meg kell felelnie az 5.2 előírásainak.

**6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

kultúra	károsító	Keze- lések szám a	szer l/ha	víz l/ha	kezelési fenostádium	várako- zási idő
őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, triticale	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (2-3 leveles állapot) (legkésőbb BBCH 14)	90 nap
rizs	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (2-3 leveles állapot)	90 nap
kukorica (takarmány, csemege, vetőmag)	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (2 leveles állapot) (legkésőbb BBCH 14)	90 nap
napraforgó, dohány, burgonya, borsó, lóbab, szója	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (2 leveles állapot)	90 nap
dohány	kacságtlás	1	1,5 %	400-500	Palántázás előtt	-
lucerna	aranka	1	8,0-10,0	200-300	Nyugalmi stádiumban	-
vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	3,0-4,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (2 leveles állapot) (legkésőbb BBCH 13)	75 nap
sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika, káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre- vagy poszt-emergens (3-4 leveles állapot)	60 nap
almatermésűek, csonthéjasok	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	300-400	Fakadás előtt, nyugalmi stádiumban	-
bogyós gyümölcsűek, szőlő	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	300-400	Fakadás előtt, nyugalmi stádiumban	-
fűszer- és gyógynövények	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Pre emergensen (Vetés után, kelés előtt)	-
dísznövények, erdészeti	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	1	4,0-5,0	200-300	Fakadás előtt, nyugalmi stádiumban	-

<i>vörös csenkesz</i>	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	<b>1</b>	4,0-5,0	200-300	A gyomnövények megjelenése előtt	-
<i>kosárfűz</i>	magról kelő egyszikű és néhány magról kelő kétszikű gyomnövény	<b>1</b>	4,0-5,0	200-300	Fakadás előtt, nyugalmi stádiumban	-

### ***Előírt növényvédelmi technológia:***

***Kalászosokban*** (őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, triticale) vetés után kelés előtt preemergensen, vagy a kultúrnövény kelése után a bokrosodás kezdetéig posztemergensen kell a készítményt kijuttatni.

***Rizsben*** a kultúrnövény kelése után annak 1-2 leveles állapotában, vagy preemergensen a vetést követő 3 napon belül kell kijuttatni. A preemergens alkalmazás esetén fontos, hogy a rizs vetése egyenletesen 2-3 cm mélységre történjen. A kezelést vízmentes területen kell elvégezni, a táblán pangó vízfoltok sem lehetnek, mert a levegő hiánya és a herbicid együttesen a rizs csírázását gátolhatják,

***Kukoricában*** a kultúrnövény vetése után, kelése előtt preemergensen, vagy korai posztemergensen kell a készítményt kijuttatni.

A készítményt a kukorica legalább 3-4 cm mélyre történt vetése után kelése előtt 4-6 l/ha adagban kell kijuttatni. A kukorica kelése után annak 4 leveles fejlettségéig a gyomok szikleveles állapotában 5 l/ha dózisban alkalmazható önmagában. Amennyiben Clio 0,15 l/ha dóziséval tankkombinációban alkalmazzuk, úgy a Stomp 330 EC dózisa 3,3 l/ha, ebben az esetben a kukorica fejlettségétől függetlenül a magról kelő egyszikűek 1-3leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni.

A készítmény csemegekukoricában, vagy vetőmag előállításban történő alkalmazása a fajtatulajdonos előzetes hozzájárulásával történhet.

***Napraforgóban*** preemergensen a vetést követő 3 napon belül, vagy ppi. 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

***Dohányban*** palántázás előtt (pree. planting) a talajra permetezve, vagy 2-3 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni. Kacsagátlásra a kezelést a tengelyvirág megjelenésekor, legkésőbb a virágzás kezdetén, tetejezést követően, a kacsok 1-3 cm-es fejlettsége mellett kell elvégezni. Dohánytövenként 10-20 ml 1,5 %-os permetlé koncentrációjú szermennyiség szükséges. Fontos a dohányszár egyenletes permetlével való fedése, a tetejétől a tövéig.

***Burgonyában*** preemergensen a végleges bakhátak kialakítása után kell a készítményt kipermetezni, amíg a burgonya csírái 3-4 cm-rel a talajfelszín alatt vannak.

***Borsóban, lóbabban*** preemergensen, a vetést követő 4-5 napon belül kell a kezelést elvégezni.

***Szójában*** preemergensen, a vetést követő 2-3 napon belül, vagy a vetés előtt ppi. sekélyen, 1-2 cm mélyen a talajba dolgozva kell alkalmazni a készítményt.

***Lucernában*** arankairtásra egy évesnél idősebb állományban kora tavasszal, a lucerna nyugalmi állapotában kell kijuttatni a készítményt.

***Hagymában*** preemergensen, a dug- és magtermő anyahagyma kiültetése után azonnal, magvetés esetén a vetést követő 3 napon belül kell a készítményt kipermetezni. Fontos az egyenletes, 3 cm mély vetésmélység. ***Étkezésre termesztett zöldhagyma gyomirtására nem használható.***

***Sárgarépa, petrezselyem*** esetében preemergensen, vetés után kelés előtt, a vetést követő 4-5 napon belül, ***zeller*** esetében a palántázás előtt 8-10 nappal kell kijuttatni a készítményt.

***Paradicsom, paprika*** (pree planting) a palánták kiültetése előtt 8-10 nappal kell a készítményt kipermetezni.

**Káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé** (pre-planting) a kultúrnövények palántáinak kiültetése előtt 8-10 nappal kell kipermetezni a készítményt. A palántázás során ügyelni kell arra, hogy a Stomp-pal kezelt legfelső talajréteget ne sodorjuk a palánta gyökeréhez. Száraz időjárás esetén a sekély 1-2 cm mély talajba dolgozás a hatékonyságot növeli.

**Almatermésűek** (alma, körte, birs, naspolya), **csonthéjasok** (kajszi, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló) esetében kora tavasszal, jól elmunkált, gyommentes, aprómorzás talajfelszínre kell kipermetezni a készítményt, száraz időjárás esetén a sekély 1-2 cm mély talajba dolgozás a hatékonyságot növeli.

**Bogyós gyümölcsűek** (ribiszke, köszméte, josta, málna, áfonya, szeder) kultúrákban kora tavasszal, gyom- és növényi maradványoktól mentes, jól elmunkált talajfelszínre kell kijuttatni a készítményt.

**Szőlőben** a készítményt kora tavasszal, a szőlő fakadása előtt, jól elmunkált, aprómorzás talajfelszínre kell kijuttatni.

**Fűszer- és gyógynövények** (kömény, édeskömény, kapor, ánizs, angelika, lestyán, koriander, ligetszépe, sáfrányos szeklice) kultúrákban preemergensen vetés után, kelés előtt kell kipermetezni a készítményt.

**Dísnövények** (tulipán, nárcisz) esetében a kezeléseket a hagymák nyugalmi időszakában kell elvégezni, fontos hogy a hagymákat 3-4 cm aprómorzás földréteg takarja.

**Erdészet** (faiskola, kosárfűz, fagyalfélék, díszcserjék, fenyőfélék, juniperus) kultúrákban a kezelést fakadás előtt, nyugalmi állapotban, a gyomnövények megjelenése előtt kell elvégezni.

**Vörös csenkeszben** a gyomnövények megjelenése előtt kell a kezelést elvégezni.

A készítmény elsősorban a magról kelő egyszikű gyomnövények, és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen hatékony. Az évelőket, valamint a fészkes virágzatúak, burgonyafélék családjába tartozó gyomnövényeket nem irtja.

**A készítmény üvegházban, valamint fólia alatti területeken nem alkalmazható!**

Laza talajokon az alacsonyabb, szerves anyagban gazdagabb, kötöttebb talajokon az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisokban kell alkalmazni.

**Légi kijuttatás:** A készítmény légi úton nem juttatható ki.

## 7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

**Veszélyjelek:**



ártalmas



környezeti veszély

a) **Mérgező** (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >500-<2000 mg/kg.

b) **Tűzveszélyességi besorolás:** **nem jelölésköteles**

c) **Vízi szervezetekre való veszélyesség:** **kifejezetten veszélyes**  
biztonsági távolság (kockázatbecslés alapján) **5 m**

d) *Méhekre való veszélyesség:***nem jelölésköteles****R-mondatok:**

- R-22** Lenyelve ártalmas  
**R-36/38** Szem és bőrizgató hatású  
**R-43** Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)  
**R50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat  
**R-65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

**S-mondatok:**

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni  
**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni  
**S 62** Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

**Különleges SP-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  
**SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

A csomagolási hulladékokra a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

**8. Várakozási idők:**

- a) *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap  
b) *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:*

<b>kultúra</b>	<i>várakozási idő (nap)</i>
<b>őszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, triticale, rizs, kukorica</b>	<b>90 nap</b>
<b>napraforgó, dohány, burgonya, borsó, lóbab, szója</b>	<b>90 nap</b>
<b>Vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma</b>	<b>75 nap</b>
<b>Sárgarépa, petrezselyem, zeller, paradicsom, paprika, káposzta, kelkáposzta, bimbóskel, karfiol, karalábé</b>	<b>60 nap</b>

**9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:**

*Egyéni védőfelszerelés:*

*előkészítőknak és kijuttatóknak:*

növényvédelmi védőruha, védőkalap,  
védőkesztyű, védőszemüveg, FFP2D szűrő

osztályú részecskeszűrővel ellátott félálarc,  
védőlábbeli:

Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

*Terápia:* tüneti megfigyelő kezelés  
*Ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

**10. Forgalmazási kategória:** **II.**

**11. Eltarthatóság:** **3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban.**

**12. Az engedély érvényessége:** **2013. december 31.**

**A termékcímkére vonatkozó döntés (címkeszöveg elfogadása)**

A növényvédő szer csak jelen határozat mellékletét képező jóváhagyott címkeszövegnek megfelelő címkével kerülhet forgalomba.

Az engedélyezési eljárás díja 2.500.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a **földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez** címzett, de az elsőfokú engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett fellebbezésnek van helye, melyet a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.- forintja után 400.- forint, de legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- forint illetékbélyeggel kell ellátni.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

**INDOKOLÁS**

Az ügyfél hazai képviselője útján 2005. 06. 27. napján kelt kérelmében a **Stomp Super gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte *a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. és 3. számú melléklete szerinti adatokat.*

A hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásait az alábbiak szerint.

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-75/2006. OTH számú és az Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KJHF-1450/4/2005 számú állásfoglalását jelen határozat rendelkező részének 7., 8., 9., 10., pontjai tartalmazzák.

Az engedélyezési eljárási díj megállapítása a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései és 11. § e) pontja



valamint a 2. számú melléklet A részének II/5 pontja alapján történt.

Az engedélyező hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az ügyfél az engedély kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta, az eljárási díjat megfizette. Ezek alapján az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 42-44. §-a, valamint a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 12-15. §-a, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 7. §., valamint a 15-17. §-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A címketerv bírálata a Nvt. 23. § (2) és (3) bekezdése, valamint a R. 30. §-a alapján történt.

Az engedélyező hatóság hatáskörét a Nvt. 11. § (1) bekezdésére, a R. 3. § (1) bekezdésére, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésére alapítva állapította meg.

A fellebbezési jog lehetőségéről, feltételeiről az Áe. 62.§ (1),(2) bekezdései, 63.§ (1) bekezdése és a 65.§ (1) bekezdése, az illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.

**Budapest, 2009. március 19.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. ügyfél hazai képviselője
2. szakhatóság (OTH)
3. szakhatóság (OKTVF)
4. irattár

54/2009